



COVID-19 백신 - 자주 묻는 질문 (FAQ)

부스터 접종

이런 백신 자주 묻는 질문(FAQ) 문서를 온라인으로 보시려면 [COVID-19 백신 웹페이지](#)를 방문하십시오.

COVID-19 백신 부스터샷 접종은 왜 중요합니까?

중증 질환을 막기 위한 예방책으로 다양한 백신에 부스터 접종은 계속 활용되고 있습니다.

사람들이 중증 질환을 앓지 않도록 [COVID-19 백신은 지속적으로 보호 효과](#)를 제공하고 있습니다 하지만 시간이 지날수록 보호력은 저감될 수 있습니다. COVID-19 백신 부스터를 접종 받는 것이 중요한 이유는 면역력을 보강해 주기 때문입니다. 여러분이 심각한 중병을 앓지 않도록 예방하고 입원 또는 사망에 이르지 않도록 한층 더 보호해줍니다.

권장하는 부스터 접종을 받으시기 바랍니다 (아래 참고).

개량 COVID-19 부스터 접종은 무엇인가요?

개량 부스터(추가접종)는 ‘2가 백신’ 부스터라고도 불립니다. COVID-19 바이러스 원종과 BA.4 및 BA.5 오미크론 변이에 표적 대항하기 위해 개량된 백신입니다.

개량된 추가 접종은 시간이 지날수록 줄어드는 보호 효과를 증강하고 새 변이에 대한 포괄적인 보호력도 제공해 줄 것입니다.

모든 화이자 및 모더나 부스터 접종은 개량(2가 백신) 백신입니다. 기존(단가) 화이자 및 모더나 백신은 더 이상 사용하지 않습니다. 노바백스 부스터는 기존(단가) 백신입니다.

COVID-19 부스터 접종은 대상은 누구인가요?

개량(2가 백신) 부스터는 생후 6개월 이상이면 모든 사람에게 접종을 권장합니다. 단, 제외되는 대상은 화이저의 기본 접종을 완료한 생후 6개월에서 만 4세의 어린이는 현재 부스터 접종 대상이 아닙니다.

개량된 추가 1회 접종은 마지막 COVID-19 백신 접종(마지막 기본 접종 또는 마지막 기존 [단가] 부스터 중 하나)를 마친 후, 최소 2개월 뒤에 권장됩니다. 이것은 과거에 투여 받은 기존(단가) 부스터의 횟수와 투여 받은 백신(들) 종류와 상관없이 가능합니다. 만 11세 이하 어린이는 십대 또는 성인 보다 적은 용량의 백신을 받습니다.

만 5세 이상인 모든 사람

- 모더나 기본 접종을 완료한 만 5세 어린이는 화이자 또는 모더나 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다
- 화이자 백신의 기본 접종을 마친 만 5세의 어린이는 화이자 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다.
- 만 6세 이상의 모든 사람은 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다.

생후 6개월-만 4세의 어린이

- 모더나 백신의 기본 접종을 완료한 어린이는 모더나 개량된 추가접종을 받을 수 있습니다.





COVID-19 백신 - 자주 묻는 질문 (FAQ)

부스터 접종

- 화이자 백신의 기본 접종을 완료한 어린이는 현재 추가접종을 받을 대상이 아닙니다. 참고 : 이 연령대를 위한 화이자 기본 접종은 현재 3 차 접종의 ‘2 가 백신 (개량) 백신을 포함합니다.

만 18세 이상인 경우 추가접종의 대안으로 사용할 수 있는 선택권이 있습니다

만 18세 이상인 경우 다음의 모든 기준을 충족하는 경우 권장하는 개량된 화이자 또는 모더나 추가접종 대신에 노바백스 (1가) 백신을 부스터 접종 대신 받을 수 있습니다.

1. 개량된 부스터 접종을 받을 수 없거나 받을 의향이 없는 경우 (예를 들어, 화이저와 모더나 mRNA 백신에 대해 심각한 알레르기 반응을 일으키는 경우); 및
2. 기본 접종 백신을 모두 받은 경우 및
3. 과거에 부스터 접종을 받은 적이 없는 경우.

노바백스 부스터는 마지막으로 기본 접종 후에 최소 6개월이 경과한 뒤에 받을 수 있습니다.

미국 질병통제 예방센터(CDC) [부스터 및 COVID-19 최신 권장 백신 받기](#) 웹페이지에서 상호적인 부스터 접종을 받아야 할 시기 틀을 방문하여 귀하 (또는 귀하 자녀)가 부스터를 받을 수 있는지 확인하십시오.

질문이 있으시면 담당 의사와 상의하기 바랍니다.

과거에 COVID에 감염된 적이 있어도 부스터 접종을 받을 수 있나요?

네, COVID-19에 감염되었다면 추가접종을 접종 받으셔야 합니다. 과거에 COVID-19에 감염된 적이 있더라도 개량된 추가접종과 같이 COVID-19 백신을 최신 권장 접종 상태로 유지하는 것이 좋습니다. 백신 투여는 추가 보호를 제공해 주기 때문입니다.

과거에 COVID-19에 감염된 경우, 백신 접종은 첫 증상의 발현 또는 최초 양성 결과(이전 증상이 없었을 경우)를 받은 시점부터 3개월 뒤에 받는 것을 고려하십시오. COVID-19에 최근 감염된 후에 처음 몇 달 동안에는 재감염 되는 확률이 적습니다. 하지만 감염과 백신 접종 간격이 시간이 길수록 면역력이 좋아질 확률이 높습니다. 하지만 접종은 3개월 뒤로 미루는 것을 권장하지 않으며 백신을 되도록 일찍 접종하는 것이 안전합니다.

현재 COVID-19에 감염된 경우, 회복될 때까지 기다렸다가(증상이 있을 경우) 격리를 마치고 COVID-19 백신을 접종 받을 수 있습니다. 이것은 백신 접종을 받을 때 COVID-19를 의료 종사자와 다른 사람에게 전염하지 않기 위한 것입니다.

부스터샷 접종에 따른 위험요인에는 무엇이 있습니까?

부스터 접종 후 반응은 기본 백신의 접종 후 반응과 유사합니다. 대부분의 부작용은 경도와 중등도 사이며 2일 이내에 사라집니다. 기본 백신과 마찬가지로 심각한 부작용은 매우 드뭅니다. 자세한 내용은 CDC 웹페이지 [COVID-19 백신 안전성](#)을 방문하십시오. 부스터샷 접종을 통해 얻는 이점은 우리에게 알려진 위험성 및 잠재적인 위험 보다는 훨씬 큼니다.

부스터샷 접종 받으려면 의사의 진단서나 처방전을 제시해야 하나요?





COVID-19 백신 - 자주 묻는 질문 (FAQ)

부스터 접종

아니요. 부스터샷 접종을 위한 의사의 진단서나 처방전이 필요 없습니다. 접종소 방문 시, CDC 흰색 백신 카드 또는 전자 백신 접종 기록과 같은 백신 접종 확인지를 지참하십시오. 공중 보건국의 [백신 접종을 받는 방법](#) 웹페이지를 방문하여 자세한 정보를 확인하십시오.

더 많은 정보를 보려면 어떻게 해야 하나요?



- 이 자주 묻는 질문 또는 다른 COVID-19 백신 주제와 관련된 자주 묻는 질문을 인쇄하거나 보시려면 QR 코드를 스캔하거나 [COVID-19 백신 자주 묻는 질문](#)을 방문하십시오.
- CDC 웹페이지 [COVID-19 백신 부스터샷 접종](#)
- [VaccinateLACounty.com](#) - 각 백신의 접종 기한을 보여주는 그래프와 [백신 접종 방법](#)에 대한 정보를 제공하는 [COVID-19 백신 일정](#) 포함.
- 질문이 있으시면 담당 의사와 상담하십시오.

